



Nachsaatmischung für bis zu drei Nutzungen

NA

Arten	Sorten	Anteil in			
		FL.-%		Gw.-%	
		mit Klee	ohne Klee	mit Klee	ohne Klee
Engl. Raygras: Ausdauer	Alligator, Allodia, Arvicola, Barcampo, Polim	15,0	15,0	15,2	14,6
Knautgras	Tandem	15,0	15,0	12,1	11,7
Timothe	Summergraze, (Tiller)	15,0	20,0	12,1	15,5
Wiesenrispe	(Balin), Chester, Guido, Hitobia, Kupol, Lato, Selista, Sextonis	25,0	30,0	30,3	35,0
Wiesenschwingel	Cosima, Cosmolit, Pardus, Pradel	15,0	15,0	18,2	17,5
Rotschwingel	Gondolin	–	5,0	–	5,8
Rotklee	Blizard, Carbo, (Merula), Milonia, Pavona, Van	5,0	–	4,0	–
Weißklee	Apis, Bombus, Edith, Klondike, Merida, Munida	10,0	–	8,1	–
Nachsaat (Schlitz- und Bandfräsvfahren, kg/ha)		20–25			
Übersaat (kg/ha)		10–15			

Engl. Raygras: Teilung in 40 % frühe, 60 % mittlere oder 30 % mittlere und 30 % späte Sorten

Nachsaatmischung ab vier Nutzungen

NI

Arten	Sorten	Anteil in			
		FL.-%		Gw.-%	
		mit Klee	ohne Klee	mit Klee	ohne Klee
Engl. Raygras: Ausdauer	Alligator, Allodia, Arvicola, Barcampo, Polim	15,0	20,0	17,2	22,7
Engl. Raygras: Ertrag	(Abergain), Artesia, Artonis, Barclima, Diwan, Eufori, Kentaur, Novello, Soraya, Soronia, Tribal	20,0	20,0	23,0	22,7
Knautgras	Tandem	25,0	35,0	23,0	31,9
Timothe	Summergraze, (Tiller)	15,0	25,0	13,8	22,7
Rotklee	Blizard, Carbo, (Merula), Milonia, Pavona, Van	15,0	–	13,8	–
Weißklee	Apis, Bombus, Edith, Klondike, Merida, Munida	10,0	–	9,2	–
Übersaat bei starker Lückigkeit ab 50 % (kg/ha)		15–20			
Übersaat bei Lückigkeit ab 10 % (kg/ha)		10–15			
Permanente Übersaat (kg/ha)		5–10			

Engl. Raygras: Teilung in 40 % frühe, 60 % mittlere oder 30 % mittlere und 30 % späte Sorten

